Gama Aminoclean

Boro 11%

Boro etanolamina

Líquido soluble SL | Abono CE | Corrector de carencias | Aplicación en fertirrigación | Aplicación foliar | Aplicación en hidroponía

Acciones

Favorece la floración y la polinización de las plantas tratadas. También facilita el transporte de azúcares a través de las membranas.

Época de aplicación

Se recomienda su uso durante la época de floración. Repitiendo su aplicación cada 10-15 días.

Riquezas garantizadas

Boro (B) soluble en agua	11% (p/p)
pH	7-8

Dosificación

FERTIRRIGACIÓN	
TODOS	2-4 L/Ha
FOLIAR	
HORTÍCOLAS	150-400 cc/100L
HIDROPONÍA	
TODOS	1-2 L/Ha

Contenido efectivo

5 L — 7,00 kg

20 L — 8,00 kg

agroclean

Polígono Industrial "La Redonda" C/ Versalles, 10 I Santa María del Águila
C.P. 04710 I El Ejido I Almería I T. +34 950 58 07 10 I informacion@agroclean.es

1

Minimiza la aparición y desarrollo de microcracking.

2

Corrector de carencias de boro en hoja.



agroclean

Polígono Industrial "La Redonda" C/ Versalles, 10 I Santa María del Águila
C.P. 04710 I El Ejido I Almería I T. +34 950 58 07 10 I informacion@agroclean.es