



Auriga

Sustancia básica a base de extracto de ortiga
(*Urtica spp*)



Líquido soluble SL



Aplicación foliar

Dosificación

FOLIAR

HORTÍCOLAS DE HOJA: Lechuga, col.	300-700 cc/HI	Pulgón: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Nazonoviaribis nigri</i>
HORTÍCOLAS: Judía	300-700 cc/HI	Pulgón: <i>Aphis phabe</i> Araña roja: <i>Tetranychus urticae</i>
HORTÍCOLAS: Patata	300-700 cc/HI	Pulgón: <i>Myzus persicae</i> Mildiu: <i>Phytophthora infestans</i>
HORTÍCOLAS: Pepino	300-700 cc/HI	Ceniza u oidio: <i>Erysiphe polyphaga</i> Alternaria: <i>Alternaria alternata f. sp cucurbitae</i>
HORTÍCOLAS CRUCÍFERAS: Brasicas	300-700 cc/HI	Pulgón de la col: <i>Phyllotreta nemorum</i> Polilla de las crucíferas: <i>Plutella xylostella</i> Alternaria: <i>Alternaria sp.</i>
FRUTALES (Manzano, ciruelo melocotonero, cerezo)	300-700 cc/HI	Pulgón: <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Myzus cerasi</i> Carpocapsa: <i>Cydia pomonella</i> Alternaria: <i>Alternaria alternata</i> Molinia: <i>Monilinia laxa</i> Botritis: <i>Botrytis Cinerea</i> Podredumbre: <i>Rhizopus Stolonifer</i>
FRUTO SECOS (nogal) y FRUTOS ROJOS (grosella)	300-700 cc/HI	Pulgón: <i>Callaphys juglandis</i> <i>Criptomyzus ribis</i>
VID	300-700 cc/HI	Araña roja: <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus telarius</i>

Intervalo entre aplicaciones: Uso contra insectos (7-15 días); Uso acaricida (7-21 días) y uso fungicida (7-15 días).

Riquezas garantizadas

Ortiga (<i>urtica spp</i>)	1,50% p/v (15g/L)
pH	6,5
Densidad	1,02 g/L

* Especificaciones según farmacopea europea.

Contenido efectivo



20L


20,4 kg



5L

5,10 kg





1

Insecticida

2

Acaricida

3

Fungicida

Insecticida



8/10

Efecto preventivo y acción repelente de insectos (principalmente pulgones)

Acaricida



8/10

Efecto preventivo y acción repelente de ácaros (principalmente araña roja)

Fungicida



4/10

Dificulta la evolución de la mayoría de los hongos