



Pegasus

Sustancia básica a base de cola de caballo
(*Equisetum Arvense*)



Líquido
soluble SL



Aplicación
foliar

Dosificación

FOLIAR

HORTÍCOLAS: Pepino	200-400 cc/Hl	2 aplicaciones con un intervalo de 3-4 días. Plazo de seguridad de 15 días	Oidio: <i>Podospahera xahantii</i> Hongos de raíz: <i>Pythium sp.</i> (aplicación en raíz)
HORTÍCOLAS: Tomate	200-400 cc/Hl	2 aplicaciones cada 14 días. Plazo de seguridad de 15 días	Alternaria (tizón temprano): <i>Alternaria solani</i> Podredumbre: <i>Septoria lycopersici</i>
HORTÍCOLAS: Patata	200-400 cc/Hl	4-8 aplicaciones cada 5-14 días. Sin plazo de seguridad	Alternaria (tizón temprano): <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i> Oidio: <i>Erysiphe cichoracearum</i>
FRUTOS ROJOS (Fresa y frambuesa)	200-400 cc/Hl	4-8 aplicaciones cada 5-14 días. Sin plazo de seguridad	Botritis: <i>Botrytis inérea</i> Oidio: <i>Podospahera aphanis</i> Pudrición del centro rojo: <i>Phytophthora fragarie</i> Otros hongos: <i>Colletotrichum acutatum</i>
FRUTALES (Manzano, Melocotonero)	200-400 cc/Hl	2 a 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Sin plazo de seguridad.	Roya: <i>Venturia inaequalis</i> Oidio: <i>Podospahera leucotricha</i> Bolladura: <i>Taphrina deformans</i>
VID	200-400 cc/Hl	2 a 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Sin plazo de seguridad.	Mildiu: <i>Plasmopara viticola</i> Oidio: <i>Erysiphe necator</i>

Riquezas garantizadas

Extracto de cola de caballo (<i>Equisetum arvense L.</i>)	2% p/v (20g/L)
pH	7,5
Densidad	1,0 Kg/L

* Especificaciones según farmacopea europea.

Contenido efectivo



20 L


20 kg



5 L

5 kg





1

Fungicida

2

Elicitor de los mecanismos de defensa de la planta

Fungicida

8/10

Efecto preventivo y acción secante frente a ciertos hongos patógenos.

Mecanismos de defensa

4/10

Estimula los mecanismos de defensa de la planta frente a ciertos hongos patógenos.